

## دستورالعمل بعد از خارج نمودن لنز پانسمان پس از عمل لازک

۱. قطره دیکلوپتین (دیکلوفناک، جعبه زرد)

✓ قطع شده بود. (حتماً دور انداخته شود)

۲. قطره کلویوتیک (کلر امفینیکل، جعبه نارنجی)

✓ هر ۶ ساعت یک قطره تا ۴ روز پس از خارج نمودن لنز ادامه پیدا کند و سپس قطع شود.

۳. قطره بتامتازون (بتازونیت، جعبه بنفش):

✓ هر ۶ ساعت تا تاریخ ادامه پیدا کند و سپس قطع شود و

قطره فلوکورت جایگزین آن می‌گردد .

به طور خلاصه قطره فلوکورت ماه اول روزانه ۴ بار ، ماه دوم روزانه ۳ بار ، ماه سوم روزانه ۲ بار و ماه آخر روزانه یک بار به شرح ذیل مصرف می‌شود .

۴. قطره فلوکورت: هر ۶ ساعت یک قطره از تاریخ

هر ۸ ساعت یک قطره به مدت یک ماه

هر ۱۲ ساعت یک قطره به مدت یک ماه

روزانه یک قطره به مدت یک ماه و سپس قطع شود.

۵. اشک مصنوعی از نوع قطره های پلاستیکی در بسته بندی یک روز مصرف از ارجحیت برخوردار می باشند

و تا زمانی که لنز در داخل چشم می باشد بهتر است از آنها استفاده شود .

میزان مصرف اشک مصنوعی وابسته به میزان خشکی چشم و علائم آن می باشد .

۶. قرص ویتامین C روزی هزار میلی گرم حداقل ۱۰ روز

محدودیت استخر و آرایش و سیگار تا یک ماه پس از عمل می باشد استفاده از لنز رنگی تا سه ماه ممنوع می باشد .

**توجه داشته باشید:**

بهبود دید شما پس از عمل جراحی لازک ممکن است از ۲ هفته تا ۲ ماه به زمان نیاز داشته باشد. در طی این مدت با رعایت موارد توصیه شده دید شما روز به روز بهتر خواهد شد. ان شاء...

**ویزیت مجدد:** تا ماه بعد از عمل با تعیین وقت قبلی انجام خواهد پذیرفت .

با آرزوی سلامتی شما

